

مقارنة بين حبوب الإجهاض

الـ Misoprostol وحده	Mifepristone و Misoprostol	
إنّ حبوب الإجهاض فعالة حتى فترة تصل إلى 12 أسبوعًا اعتبارًا من اليوم الأول لآخر دورة شهرية.	تعمل حبوب الإجهاض بفعالية حتى فترة تصل إلى 11 أسبوعًا اعتبارًا من اليوم الأول لآخر دورة شهرية.	كم يمكن أن يكون قد انقضى من فترة الحمل؟
تستخدمين 4 حبوب misoprostol كل 3 ساعات، 3 مرات متتالية، بإجمالي 12 حبة.	<ul style="list-style-type: none"> • يمكنك تناول قرص الـ mifepristone في الوقت الذي ترينه مناسبًا قد تشعرين ببعض الغثيان بعد تناول الحبة الأولى. • وبعد مرور 6 إلى 72 ساعة، تتناولين 4 حبوب misoprostol. <p>إذا كنت في الأسبوع 9 إلى 11 من الحمل، فيجب عليك تناول حبوب misoprostol الأربعة من جديد بعد مرور 4 ساعات</p>	كيف أتناول هذه الحبوب؟
تضعين حبوب misoprostol داخل تجويف الخد أو تحت اللسان أو في المهبل. ثم تبتلعين أو تتخلصين مما تبقى من الحبوب بعد 30 دقيقة.		كيف استخدم الـ misoprostol؟
وقد تُصابين بالإسهال أو الحمى أو القشعريرة. تبدأ التقلصات والنزيف بعد بضع ساعات من استخدام حبوب misoprostol. قد يبدأ النزيف الشديد بعد الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. ستعانين من نزيف شديد وتشعرين بالتقلصات لبضع ساعات.	وقد تُصابين بالإسهال أو الحمى أو القشعريرة. قد تلاحظين ببعض النزيف بعد تناول الـ mifepristone أو لا. تبدأ معظم التقلصات والنزيف بعد بضع ساعات من استهلاك حبوب misoprostol. ستعانين من نزيف شديد وتشعرين بالتقلصات لبضع ساعات.	ما الذي سيحدث؟
	شعرت بالتقلصات والنزيف. جاءت نتيجة اختبار الحمل سلبية بعد أربعة أسابيع. لم تعودي تشعرين بأنك حامل.	كيف يمكنني التأكد من أن العملية قد نجحت؟
	اتصلي بالطبيب في حال: - لم تلاحظي أيّ نزيف. (قد يعني هذا أن الأقراص لم تكن فعالة). - تقيأت بعد أقل من 30 دقيقة من تناول الـ mifepristone. - إذا ارتفعت درجة حرارتك إلى 100.4 درجة أو أكثر بعد أكثر من 24 ساعة على تناول الـ misoprostol. - تعانين من ألم شديد في البطن لا يزول حتى بعد تناول مسكنات الألم. - ما زلتِ تشعرين وكأنك حامل.	ما هي العوارض غير الطبيعية؟

*بعد انقضاء 12 أسبوعًا على الحمل، استشيرِي الطبيب أو اتصلي بالخط الساخن M+A على الرقم (1-833-246-2632)

مقارنة بين حبوب الإجهاض

الـ Misoprostol وحده	Mifepristone و Misoprostol	
	<p>قد يقترح الطبيب جرعة إضافية من الـ misoprostol في حال:</p> <ul style="list-style-type: none"> - لم تلاحظي أي نزيف. - عانيت من النزيف لأكثر من شهر. 	<p>متى قد أحتاج إلى المزيد من الأدوية</p>
<p>يمكن لمسكنات الألم مثل ibuprofen و naproxen أن تساعد في التخفيف من الألم.</p>	<p>يختلف الأمر كثيراً من شخص لآخر. كنت تعانين من تقلصات خفيفة إلى قوية جداً بشكلٍ متقطع أثناء الإجهاض. يمكن لمسكنات الألم مثل ibuprofen و naproxen أن تساعد في التخفيف من الألم.</p>	<p>كم سأشعر بالألم؟</p>
<p>توقعي نزيفاً شديداً مع بعض الدم المتجلط لبضع ساعات. بعد ذلك، قد تلاحظين نزيفاً أخف من حين لآخر لبضعة أسابيع.</p>	<p>توقعي نزيفاً شديداً مع بعض الدم المتجلط لبضع ساعات. بعد ذلك، قد تلاحظين نزيفاً أخف من حين لآخر لبضعة أسابيع.</p>	<p>كم سأنزف؟</p>
<p>تختلف الكلفة. يتراوح معدل كلفة الإجهاض في العيادة بين 400 و 600 دولار. أما معدل كلفة الإجهاض من خلال خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، فيبلغ 150 دولار أو أكثر. إن حبوب Misoprostol أقل كلفة من الـ mifepristone.</p>	<p>تختلف الكلفة. يتراوح معدل كلفة الإجهاض في العيادة بين 400 و 600 دولار. أما معدل كلفة الإجهاض من خلال خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، فيبلغ 150 دولار أو أكثر. إن حبوب Misoprostol أقل كلفة من الـ mifepristone.</p>	<p>كم تبلغ تكلفة الحبوب؟</p>
<p>الحبوب آمنة. ونادراً ما ينتج عنها أي مشكلات كبيرة.</p> <p>قد لا تكون هذه الحبوب آمنة لك إذا كنت:</p> <ul style="list-style-type: none"> - حامل وتستخدمين جهازاً رحمياً لمنع الحمل (IUD) - تتناولين أدوية لتسييل الدم - تعانين من عوارض حملٍ خارج الرحم كالآلم الحاد في أحد جانبي أسفل البطن 	<p>الحبوب آمنة. ونادراً ما ينتج عنها أي مشكلات كبيرة.</p> <p>قد لا تكون هذه الحبوب آمنة لك إذا كنت:</p> <ul style="list-style-type: none"> - حامل وتستخدمين جهازاً رحمياً لمنع الحمل (IUD) - تتناولين أدوية لتسييل الدم - تعانين من عوارض حملٍ خارج الرحم كالآلم الحاد في أحد جانبي أسفل البطن 	<p>هل هذه الحبوب آمنة؟</p>
<p>هذه الحبوب فعالة بنسبة 80-95% من الوقت. إذا فشلت الحبوب، يمكنك تناولها من جديد أو إجراء عملية إجهاض.</p>	<p>هذه الحبوب فعالة بنسبة 98-99% من الوقت. إذا فشلت الحبوب، يمكنك تناولها من جديد أو إجراء عملية إجهاض.</p>	<p>هل يمكن أن تفشل هذه الحبوب؟</p>
<p>نعم. لا تؤثر حبوب الإجهاض على الحمل في المستقبل. يمكنك أن تحملي مرة أخرى مباشرةً.</p>	<p>نعم. لا تؤثر حبوب الإجهاض على الحمل في المستقبل. يمكنك أن تحملي مرة أخرى مباشرةً.</p>	<p>هل سيبقى بإمكانني الإنجاب بعد ذلك؟</p>
<p>صحيفة الإرشادات حول كيفية استخدام حبوب الإجهاض</p> <p>كيفية استخدام الـ Misoprostol-Only كدواء للإجهاض</p> <p>”دليل الخطة ج لحبوب الإجهاض“</p> <p>/https://abortionpillinfo.org</p> <p>الخط الساخن M+A</p>	<p>صحيفة الإرشادات حول كيفية استخدام حبوب الإجهاض</p> <p>كيفية استخدام الـ Misoprostol-Only كدواء للإجهاض</p> <p>”دليل الخطة ج لحبوب الإجهاض“</p> <p>/https://abortionpillinfo.org</p> <p>الخط الساخن M+A</p>	<p>كيف يمكنني الحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية الحصول على هذه الحبوب واستخدامها؟</p>
<p>إن/متى/كيف: خط المساعدة القانونية للشؤون الإنجابية</p> <p>صندوق الدفاع الرقمي</p>	<p>إن/متى/كيف: خط المساعدة القانونية للشؤون الإنجابية</p> <p>صندوق الدفاع الرقمي</p>	<p>أين يمكنني الحصول على المزيد من المساعدة؟</p>