

# Comparaison des Pilules Abortives

	<b>Mifépristone et Misoprostol</b>	<b>Misoprostol Seul</b>
<b>Jusqu'où dans la grossesse puis-je être ?</b>	<b>Jusqu'à 11 semaines</b> à partir du premier jour de vos dernières règles.	<b>Jusqu'à 12 semaines</b> à partir du premier jour de vos dernières règles.
<b>Comment est-ce que je prends les pilules ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous avalez la <b>mifépristone</b> à un moment qui vous convient le mieux. Vous pouvez avoir des nausées après la première pilule.</li> <li>6-72 heures plus tard, vous insérez 4 pilules de <b>misoprostol</b>.</li> </ul> <p><i>Si votre grossesse est de 9-11 semaines, vous devez répéter le <b>misoprostol</b> : insérez 4 pilules 4 heures plus tard.</i></p>	Vous placez 4 pilules de <b>misoprostol</b> toutes les 3 heures, 3 fois de suite, pour un total de 12 pilules.
<b>Comment est-ce que j'insère le misoprostol ?</b>	Vous mettez comprimés de misoprostol dans votre joue, sous votre langue ou dans votre vagin. Vous avalez ou jetez ce qui reste des pilules après 30 minutes.	
<b>Qu'est-ce qui se passera ?</b>	<p>Vous pouvez avoir des selles molles, de la fièvre ou des frissons.</p> <p>Vous pouvez ou non avoir des saignements après la prise de mifépristone. La plupart des crampes et des saignements commencent quelques heures après l'insertion du misoprostol. Vous aurez des saignements abondants et des crampes pendant quelques heures.</p>	<p>Vous pouvez avoir des selles molles, de la fièvre ou des frissons.</p> <p>Vous pouvez ou non avoir des saignements après la prise de mifépristone. La plupart des crampes et des saignements commencent quelques heures après l'insertion du misoprostol. Vous aurez des saignements abondants et des crampes pendant quelques heures.</p>
<b>Comment est-ce que je sais s'il a fonctionné ?</b>	<p>Vous aviez des crampes et des saignements.</p> <p>Vous avez eu un test de grossesse négatif quatre semaines plus tard.</p> <p>Vous ne vous sentiez plus enceinte.</p>	
<b>Qu'est-ce qui n'est pas normal ?</b>	<p>Contactez un clinicien si :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous n'avez aucun saignement (Cela peut signifier que les pilules n'ont pas fonctionné.)</li> <li>- Vous avez vomi moins de 30 minutes après la prise de la mifépristone.</li> <li>- Vous avez une fièvre de 100,4 ou plus plus de 24 heures après la prise du misoprostol.</li> <li>- Vous avez des douleurs abdominales intenses qui ne disparaissent pas avec les analgésiques.</li> <li>- Vous vous sentiez toujours comme vous êtes enceinte.</li> </ul>	

\*Au-delà de 12 semaines, consultez un clinicien ou une ligne d'assistance téléphonique (1-833-246-2632)

# Comparaison des Pilules Abortives

	Mifépristone et Misoprostol	Misoprostol Seul
<b>Quand pourrais-je avoir besoin de plus de médicaments</b>	Un clinicien peut suggérer une dose supplémentaire de misoprostol si : - Vous n'aviez aucun saignement - Vous avez des saignements depuis plus d'un mois.	
<b>À quel point est-il douloureux ?</b>	Cela varie beaucoup d'une personne à l'autre. Vous pouvez avoir des crampes légères à très fortes pendant l'avortement. Les analgésiques comme l'ibuprofène et le naproxène les aident.	
<b>Combien est-ce que je saignerais ?</b>	Attendez-vous à des saignements abondants avec des caillots pendant quelques heures. Après cela, vous pourriez avoir des saignements plus légers pendant quelques semaines.	
<b>Combien est-ce que les pilules coûtent ?</b>	Le coût varie. 400-600 \$ est le coût moyen d'un avortement en clinique. 150 \$ est le coût moyen d'un avortement en télésanté.  Les pilules de misoprostol coûtent moins cher que la mifépristone.	
<b>Est-ce que les pilules sont sûres ?</b>	Les pilules sont sûres. Les gros problèmes sont rares. Ces pilules pourraient ne pas être sûres pour vous si vous : - Êtes enceinte d'un stérilet - Prenez des médicaments pour fluidifier votre sang - Présentez des signes de grossesse extra-utérine comme une douleur vive d'un côté du bas du ventre	
<b>Est-ce que les pilules peuvent échouer ?</b>	Les pilules fonctionnent 98-99% du temps. Si les pilules échouent, vous pouvez essayer à nouveau les pilules ou avoir une procédure d'avortement.	Les pilules fonctionnent 80-95% du temps. Si les pilules échouent, vous pouvez essayer à nouveau les pilules ou avoir une procédure d'avortement.
<b>Est-ce que je peux encore avoir des enfants après ?</b>	<b>Oui.</b> Les pilules abortives n'ont aucun effet sur les futures grossesses. Vous pouvez retomber enceinte tout de suite.	
<b>Où est-ce que je peux obtenir plus de détails sur la façon d'obtenir et d'utiliser ces pilules?</b>	<a href="#">Fiche d'information sur comment utiliser les pilules abortives</a> <a href="#">Comment utiliser le misoprostol-seulement pour un avortement médicamenteux</a> <a href="#">Guide de Plan C des pilules abortives</a> <a href="https://abortionpillinfo.org/">https://abortionpillinfo.org/</a> <a href="#">Hotline M + A</a>	
<b>Où est-ce que je peux obtenir plus d'aide?</b>	<a href="#">Si/Quand/Comment : Assistance juridique de reproduction</a> <a href="#">Fonds de défense numérique</a>	