

مقایسه قرص های سقط

فقط میزوپروستول	میفپریستون و میزوپروستول	
<p>حداکثر 12 هفته پس از روز اول آخرین عادت ماهیانه خود.*</p>	<p>حداکثر 11 هفته پس از روز اول آخرین عادت ماهیانه خود.</p>	<p>در چند هفته‌گی حاملگی می‌توانم باشم؟</p>
<p>هر 3 ساعت، 3 بار متوالی، برای مجموعاً 12 قرص، 4 قرص میزوپروستول را قرار دهید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> میفپریستون را زمانی مصرف می‌کنید که بهترین تأثیر را برای شما دارد. ممکن است پس از مصرف اولین قرص دچار حالت تهوع شوید. 6-72 ساعت بعد، 4 قرص میزوپروستول قرار دهید. <p>اگر حاملگی شما 9-11 هفته است، باید میزوپروستول را تکرار کنید: 4 ساعت بعد 4 قرص دیگر قرار دهید.</p>	<p>چگونه قرص‌ها را مصرف کنم؟</p>
<p>میزوپروستول را درون گونه، زیر زبان یا در واژن خود قرار دهید. مقداری از قرص که پس از 30 دقیقه باقی مانده است را قورت دهید یا دور بریزید.</p>		<p>چگونه میزوپروستول را قرار دهم؟</p>
<p>ممکن است دچار مدفوع شل، تب یا لرز شوید. انقباضات و خونریزی پس از قرار دادن میزوپروستول شروع می‌شوند. خونریزی سنگین ممکن است پس از دوز اول، دوم یا سوم شروع شود. ممکن است به مدت چند ساعت دچار خونریزی سنگینی شوید.</p>	<p>ممکن است دچار مدفوع شل، تب یا لرز شوید. ممکن است پس از مصرف میفپریستون دچار خونریزی شوید یا نشوید. بیشتر انقباضات و خونریزی چند ساعت پس از وارد کردن میزوپروستول شروع می‌شوند. ممکن است به مدت چند ساعت دچار خونریزی سنگینی شوید.</p>	<p>چه اتفاقی خواهد افتاد؟</p>
<p>شما انقباضات و خونریزی داشتید. آزمایش حاملگی شما چهار هفته بعد منفی شده باشد. دیگر احساس حاملگی نکنید.</p>		<p>از کجا بفهمم اثر کرده است؟</p>
<p>در این صورت با پزشک تماس بگیرید:</p> <ul style="list-style-type: none"> - خونریزی ندارید. (ممکن است قرص اثر نکرده باشد). - کمتر از 30 دقیقه پس از مصرف میفپریستون قرص را دور انداخته‌اید. - بیش از 24 ساعت پس از مصرف میزوپروستول دارای تب 100.4 یا بالاتر هستید. - دارای شکم درد شدیدی هستید به طوری که با مصرف مسکن رفع نمی‌شود. - هنوز احساس می‌کنید حامله هستید. 		<p>چه چیزهایی عادی نیست؟</p>

*بیشتر از 12 هفته، با یک پزشک یا خط ویژه (1-833-246-2632) مشاورت کنید.

مقایسه قرص های سقط

فقط میزوپروستول	میفپریستون و میزوپروستول	
	<p>در صورتی ممکن است پزشک مصرف دوز بیشتری را پیشنهاد دهد که:</p> <ul style="list-style-type: none"> - خونریزی نداشته باشید. - بیشتر از یک ماه دچار خونریزی باشید. 	<p>چه زمانی ممکن است به مصرف داروی بیشتری نیاز داشته باشیم؟</p>
	<p>این مورد در هر فردی متفاوت است. شما ممکن است در حین سقط گاه و بیگاه دچار انقباضات خفیف تا بسیار شدید شوید. قرص های مسکن مثل ایبوپروفن و ناپروکسن می توانند مفید باشند.</p>	<p>چقدر دردناک است؟</p>
	<p>انتظار خونریزی شدید همراه با لخته به مدت چندین ساعت را داشته باشید. پس از آن، گاه و بیگاه به مدت چند هفته دچار خونریزی سبکتری شوید.</p>	<p>چقدر خونریزی خواهم داشت؟</p>
	<p>هزینه ها متفاوت است. متوسط هزینه برای یک سقط داخل مطب 400-600 دلار است. متوسط هزینه برای سقط تلفنی بالای 150 دلار است.</p> <p>قیمت قرص میزوپروستول کمتر از قرص میفپریستون است.</p>	<p>قیمت قرص ها چقدر است؟</p>
	<p>این قرص ها بی خطر هستند. مشکلات بزرگ نادر هستند.</p> <p>در صورتی این قرص ها برای شما ممکن است خطرناک باشند که شما:</p> <ul style="list-style-type: none"> - با IUD حامله شده باشید - در حال مصرف داروی رقیق کننده خون هستید - دارای علائم حاملگی خارج رحمی هستید مثل درد تیرکشنده در یک طرف پایین شکم خود 	<p>آیا این قرص ها بی خطر هستند؟</p>
<p>این قرص ها 80-95% مواقع اثر می کنند. در صورتی که قرص ها اثر نداشتند، می توانید دوباره مصرف قرص را امتحان کنید یا عمل سقط انجام دهید.</p>	<p>این قرص ها در 98-99% مواقع اثر می کنند. در صورتی که قرص ها اثر نداشتند، می توانید دوباره مصرف قرص را امتحان کنید یا عمل سقط انجام دهید.</p>	<p>آیا ممکن است این قرص ها بی تاثیر باشند؟</p>
	<p>بله. قرص های سقط تاثیری روی حاملگی های آینده ندارند. شما می توانید بلافاصله حامله شوید.</p>	<p>پس از آن هنوز می توانم فرزند داشته باشم؟</p>
	<p>برگه اطلاعات نحوه مصرف قرص های سقط نحوه مصرف فقط میزوپروستول برای سقط دارویی راهنمای قرص های سقط طرح C https://abortionpillinfo.org/ خط ویژه M+A</p>	<p>از کجا می توانم در مورد نحوه تهیه و مصرف این قرص ها اطلاعات بیشتری کسب کنم؟</p>
	<p><u>اگر / چه زمانی / چگونه: خط امداد قانونی باروری</u> <u>صندوق دفاع دیجیتال</u></p>	<p>از کجا می توانم راهنمایی بیشتری دریافت کنم؟</p>