

የቅድመ እርግዝና መቋረጥ (የፅንሰ መጨንገፍ) ሕክምና ምርጫዎቹ ምንድን ናቸው?

	ማየት እና መጠበቅ	መድሃኒት	የህክምና ሂደት
እንዴት ነው የሚሠራው?	የእርግዝና ህብረ ህዋስ በራሱ እንዲያልፍ ይጠብቃሉ። ይህ የሚከሰተው ከቁርጠት እና ከረጋ ደም መፍሰስ ጋር ነው።	ሚፈጥረዎትን እና ሚሶፕሮስቶል የተባሉ ክሊኖች የእርግዝና ህብረ ህዋስ እንዲያልፍ ለማገዝ እንደ ላይ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። እንዲሁም ሚሶፕሮስቶል ክሊኖችን ብቻውን መጠቀም ይችላሉ። እነዚህን ክሊኖች በቤት ውስጥ ይጠቀማሉ።	አንድ ሃኪም የእጅ ቫክዩም አስፓይሬሽን (MVA፣ manual vacuum aspiration) ተብሎ በሚጠራው ቀለል የቢሮ ውስጥ የመጥረግ ህክምና የእርግዝና ህብረ ህዋሱን ያስወግዳል። ይህ በተወሰነ የሰውነት አካባቢ ማደንዘዥ ወይም ማስታገሻ ሊከናወን ይችላል።
ምንድነው የሚሆነው?	ቁርጠት እና የደም መፍሰስ እስኪከሰት ድረስ ይጠብቃሉ። ይህ በማንኛውም ጊዜ ሊከሰት ይችላል። የደም መፍሰሱ እና ቁርጠቱ ከወር አበባ ጊዜ የበለጠ ከባድ ሊሆን ይችላል። ቢያንስ ለተወሰኑ ሰዓታት ከባድ ደም ይፈሰሳል። ቀለል ያለ የደም መፍሰስ ብዙውን ጊዜ ከ1-2 ሳምንታት ይቆያል። ጥቂት ጊዜ ሊቆም እና ሊጀምር ይችላል።	ከተጠቀመ፣ በመጀመሪያ ሚፈጥረዎትን ክሊን ይዋጡ፣ ከዚያ ከ 24 ሰዓታት በኋላ ሚሶፕሮስቶል ክሊኖችን በቤት ብልትዎ ውስጥ ወይም በጉንጮችዎ እና በድድዎ መካከል ያስቀምጣሉ። ማንኛውንም ቁርጠት እና የደም መፍሰስን ለማስታገስ የሚሶፕሮስቶል ክሊኖችን ከመውሰድዎ አንድ ሰዓት በፊት የህመም ክሊኖችን ይውሰዱ። ሚሶፕሮስቶል ማቅለሽለሽ፣ ተቅማጥ እና/ወይም ዝቅተኛ ትኩሳት ሊያስከትል ይችላል የደም መፍሰሱ እና ቁርጠት ከወር አበባ ጊዜ የበለጠ ከባድ ሊሆን ይችላል። ይህ ክሊን ከወሰዱ በኋላ ከ2-6 ሰዓታት አካባቢ ውስጥ ይጀምራል። ቀለል ያለ የደም መፍሰስ ብዙውን ጊዜ ከ 1 እስከ 2 ሳምንታት የሚቆይ ሲሆን ጥቂት ጊዜ ሊቆም እና ሊጀምር ይችላል።	የእጅ ቫክዩም አስፓይሬሽን በቢሮ ውስጥ ሊከናወን ይችላል። ሃኪሙ በእጅ በሚያዝ መሳሪያ በመጠቀም የእርግዝና ህብረ ህዋሱን ያስወግዳል። ቀለል ያለ የደም መፍሰስ እና ቁርጠት ከ 3 እስከ 7 ቀናት ለሚሆን ጊዜ ሊኖርዎት ይችላል።
ምን ያህል ህመም አለው?	ከባድ ቁርጠት ሊኖርዎት ይችላል። የህመም ማስታገሻ ክሊኖች እና ማሞቂያ ፓድ ህመም የሚያስከትል ቁርጠትን ለማስታገስ ሊረዱ ይችላሉ።	ከባድ ቁርጠት ይኖርዎታል። የህመም ክሊኖች እና ማሞቂያ ፓድ ህመም የሚያስከትል ቁርጠትን ለመቀነስ ሊረዱ ይችላሉ።	በእጅ ቫክዩም አስፓይሬሽን ወቅት ከመለስተኛ እስከ ከባድ ቁርጠት ሊኖርብዎት ይችላል።
ምን ያህል ውጤታማ ነው?	ይህ ከ 70-80% ጊዜ ይሠራል። ቁድሞውን የተወሰነ የደም መፍሰስ ከነበረዎት የተሻለ ይሠራል።	ክሊኖች ከ 75-90% ጊዜ ይሠራሉ።*	የእጅ ቫክዩም አስፓይሬሽን ከ 98-100% ጊዜ ይሠራል።
ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል?	ይህ ጥቂት ሳምንታትን ሊወስድ ይችላል።	ክሊኖች በ 2 ቀናት ውስጥ በ 84% ታካሚዎች ላይ ማህፀንን ባዶ ያደርጋሉ።*	በእጅ ቫክዩም አስፓይሬሽን ወቅት፣ ማህፀን ባዶ ይደረጋል (rearranged the phrases)፣ ይህም ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ያህል ይቆያል።
በጣም ረጅም ጊዜ የሚወስድ ወይም የማይሠራ ከሆነ?	በጣም ረጅም ጊዜ የሚወስድ ከሆነ ለክሊኖች ወይም ለመጥረግ ህክምና በማንኛውም ጊዜ ወደ ሐኪምዎ ቢሮ መመለስ ይችላሉ።	የማይሠራ ከሆነ ወይም ብዙ ጊዜ የሚወስድ ከሆነ ለመጥረግ ህክምና ወይም ለሌላ ዶክተር ወደ ክሊኒክዎ መመለስ ይችላሉ።	አልፎ አልፎ በማይሠራበት ጊዜ፣ ለሌላ የእጅ ቫክዩም አስፓይሬሽን መመለስ ይችላሉ።
ደህንነት የተጠበቀ ነው?	አዎ። ሦስቱም የሕክምና አማራጮች አስተማማኝ ናቸው።		
ከዚያ በኋላ ልጆች መውለድ እችላለሁ?	አዎ። እነዚህ ሕክምናዎች ወደፊት እንዲያረገዙ ወይም እርግዝና እንዲቆይልዎት አያግዱዎትም። እርግዝና ከተቋረጠ በኋላ ልክ ዝግጁ ነኝ ብለው ሲያሰቡ ወዲያውኑ ለማርገዝ መዋከር መጀመር ይችላሉ።		
የቅድመ እርግዝና መቋረጥ እንዲፈጠር ያደረገው ምንድን ነው?	አባክዎን አርሰዎ ያደረጉት ማንኛውም ነገር እርግዝና እንዲቋረጥ ምክንያት እንዳልሆነ ይገነዘቡ። ከ 4 ሰዎች በ 1 ላይ የቀደምት እርግዝና መቋረጥ ይከሰታል። የእርግዝና መቋረጥ የሚከሰትበትን ሁሉንም ምክንያቶች ሙሉ በሙሉ አንረዳም። በጭንቀት፣ በስፖርት፣ በምግብ ወይም በግብረ ስጋ ግንኙነት ምክንያት እይከሰትም።		

*ሚፈጥረዎትን (Mifepristone) ሁልጊዜ እይገኝም። በሚፈጥረዎትን የሰኬት ምጣኔው በአጠቃላይ 84% በ 2 ቀናት እና 89% በ 8 ቀናት ነው። በሚሶፕሮስቶል ብቻ የሰኬት ምጣኔው በአጠቃላይ 67% በ 2 ቀናት እና 84% በ 8 ቀናት ነው።